

**Theorem 1 (Residuum).** Für eine in einer punktierten Kreisscheibe  $D \setminus \{a\}$  analytische Funktion  $f$  definiert man das *Residuum* im Punkt  $a$  als

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \operatorname{Res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(z) dz,$$

wobei  $C \subset D \setminus \{a\}$  ein geschlossener Weg mit  $n(C, a) = 1$  ist (z. B. ein entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufener Kreis).

ΑΛΔ∇ΒCΔΣΕFΓGHIJKLMNOΘΩΡΦΠΞQRTUVWXYΥΨΖ ABCDabcd1234  
 $a\alpha b\beta c\delta d\delta e\epsilon f\zeta \xi g\gamma h\hbar i i j k\kappa l\ell \lambda m n \eta \theta \vartheta o \sigma \varsigma \phi \varphi \wp \rho \rho \rho q r s t \tau \pi \mu \nu \varsigma \omega \omega \omega$

$x y z \infty \propto \emptyset y = f(x)$

$$\Sigma f \Pi \Pi \int \Sigma \Sigma_a^b f_a^b \Pi_a^b \sum_a^b \int_a^b \prod_a^b$$