

easybook 书籍文档类

瞿毅¹

<https://latexstudio.net>

<https://gitee.com/texl3/easybook>²

2021/04/20 v1.24p

¹ quee123@foxmail.com.

² Gitee 为项目的主要发布地址。

目 录

第一部分 使用示例	1
第一章 多彩盒子	2
1.1 定理	2
1.2 习题	3
第二章 常用环境	4
2.1 公式	4
2.2 插图	5
2.3 表格	5
2.4 列表	6
第三章 其它格式	7
3.1 代码	7
3.2 物理量	7
3.3 化学式	7
3.4 引用	8
附录 A 维基百科	9
A.1 阿司匹林	9
参考文献	10
图片索引	11
表格索引	12
代码索引	13
索 引	14

第一部分 使用示例

第一章 多彩盒子

摘要

- 这是一个摘要盒子。
- 它的标题是可选参数，默认标题是摘要。

1.1 定理

定理 1.1 (中文定理^a)。 冬季日短，又是雪天，夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙，但窗外很寂静。雪花落在积得厚厚的雪褥上面，听去似乎瑟瑟有声，使人更加感得沉寂。我独坐在发出黄光的菜油灯下，想，这百无聊赖的祥林嫂，被人们弃在尘芥堆中的，看得厌倦了的陈旧的玩物，先前还将形骸露在尘芥里，从活得有趣的人们看来，恐怕要怪讶她何以还要存在，现在总算被无常打扫得干干净净了。魂灵的有无，我不知道；然而在现世，则无聊生者不生，即使厌见者不见，为人为己，也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声，一面想，反而渐渐的舒畅起来。

^a 选自鲁迅的祝福定理 1.1。

定义 1.1 (English definition). Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

引理 1.1. 这是一个引理。

推论 1.1. 这是一个推论。

性质 1.1. 这是一个性质。

例 1.1. 这是一个例。

注. 这是一个注。

证明. 这是一个证明，末尾自动添加证明结束符。

□

An introduction to aspirin on Wikipedia

自古以来，人们就知道含有活性成分水杨酸的植物提取物（如柳树皮和绣线菊属植物）能够镇痛、退烧。希波克拉底（约前 460 年—前 377 年）留下的历史记录就描述了柳树的树皮和树叶磨成的粉能够缓解以上症状。

自古以来，人们就知道含有活性成分水杨酸的植物提取物（如柳树皮和绣线菊属植物）能够镇痛、退烧。希波克拉底（约前 460 年—前 377 年）留下的历史记录就描述了柳树的树皮和树叶磨成的粉能够缓解以上症状。

阿司匹林

自古以来，人们就知道含有活性成分水杨酸的植物提取物（如柳树皮和绣线菊属植物）能够镇痛、退烧。希波克拉底（约前 460 年—前 377 年）留下的历史记录就描述了柳树的树皮和树叶磨成的粉能够缓解以上症状。

自古以来，人们就知道含有活性成分水杨酸的植物提取物（如柳树皮和绣线菊属植物）能够镇痛、退烧。希波克拉底（约前 460 年—前 377 年）留下的历史记录就描述了柳树的树皮和树叶磨成的粉能够缓解以上症状。

1.2 习题

我先是诧异，接着是很不安，似乎这话于我有关系。试望门外，谁也没有。好容易待到晚饭前他们的短工来冲茶，我才得了打听消息的机会。

1. 我先是诧异，接着是很不安，似乎这话于我有关系。试望门外，谁也没有。好容易待到晚饭前他们的短工来冲茶，我才得了打听消息的机会。

(A) 我先是诧异，接着是很不安，似乎这话于我有关系。试望门外，谁也没有。好容易待到晚饭前他们的短工来冲茶，我才得了打听消息的机会。

第二章 常用环境

2.1 公式

含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n] \quad (2.1)$$

可以通过添加标签在正文中引用公式，如带有中文括号的引用式（2.1）。

血液中的水杨酸有 50–80% 与白蛋白结合，其余是具有活性的电离态。药物和蛋白质的结合和浓度有关。结合位点饱和以后游离态的水杨酸就会增加，其毒性也会增强。药物的分布体积是 0.1–0.2 升每千克。酸中毒会增强水杨酸向组织中的渗透，从而增加药物的分布体积。

$$\begin{aligned} \iint_A E\rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})dA + \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V E\rho dV &= \frac{\delta Q}{dt} - \frac{\delta W}{dt} \\ \iint_A \left(U + \frac{v^2}{2} + gz + \frac{P}{\rho} \right) \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})dA + \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V E\rho dV &= \frac{\delta Q}{dt} - \frac{\delta W_s}{dt} \end{aligned} \quad (2.2)$$

含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

$$y = \begin{cases} C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} & p^2 - 4q > 0 \\ (C_1 + C_2) e^{r_1 x} & p^2 - 4q = 0 \\ e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) & p^2 - 4q < 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} (2.3a) \\ (2.3b) \\ (2.3c) \end{aligned}$$

若按治疗剂量服用，则有多达 80% 的水杨酸在肝脏中代谢。它和甘氨酸反应生成水杨酰胺乙酸，但这种代谢途径容量有限。少量水杨酸也会羟基化形成龙胆酸。大剂量服用时，药物代谢从一级反应变为零级反应，因为代谢途径已饱和，肾脏的排出变得更加重要。

2.2 插图

当我们需要排列一组子图共享标题的图片时，可以使用依赖于 `caption` 宏包的 `subcaption` 宏包的功能，效果见图 2.1。




图 2.1 使用 `subcaption` 宏包的 `subcaptionbox` 命令排版子图

Figure 2.1 Use the `subcaptionbox` command of the `subcaption` package to typeset sub-pictures

2.3 表格

合并表格列使用 `\multicolumn` 命令，合并行可以使用 `multirow` 宏包的 `\multirow` 命令。当插入的表格内容过长以至于一行放不下的情况可以使用 `tabularx` 环境，文档类设置了 L、C 和 R 三个列对齐选项，一个例子如表 2.1 所示。

表 2.1 使用 `tabularx` 创建内容过长表格

Table 2.1 Use `tabularx` to create a table with too long content

Aliquam	Integer	Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices.
viverra	metus	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.
semper		Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.
	convallis	Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem.

2.4 列表

2.4.1 排序列表

1. 制取阿司匹林的反应通常归为酯化反应。水杨酸和乙酸酐（一种乙酸的衍生物）发生反应，水杨酸中的羟基替换为酯基，生成阿司匹林和副产物乙酸。通常用少量硫酸作催化剂（有时用磷酸）。

含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

(a) 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

i. 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

2.4.2 常规列表

- 制取阿司匹林的反应通常归为酯化反应。水杨酸和乙酸酐（一种乙酸的衍生物）发生反应，水杨酸中的羟基替换为酯基，生成阿司匹林和副产物乙酸。通常用少量硫酸作催化剂（有时用磷酸）。

含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

– 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

* 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

2.4.3 主题列表

主题一 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

主题二 含高浓度阿司匹林的制剂常有醋味，这是因为阿司匹林会在潮湿的环境下发生水解，分子分解成水杨酸和乙酸。

第三章 其它格式

3.1 代码

制取阿司匹林的反应通常归为酯化反应。水杨酸和乙酸酐（一种乙酸的衍生物）发生反应，水杨酸中的羟基替换为酯基，生成阿司匹林和副产物乙酸。通常用少量硫酸作催化剂（有时用磷酸）。

代码 3.1 python 程序练习题

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-


i = ['a','b']
l = [1,2]
print dict([i,l])
```

3.2 物理量

阿司匹林还有三种作用方式 $-21 \times 0.3 \times 10^5$ 。一是使线粒体的氧化磷酸化解偶联 12~35 min。阿司匹林会携带质子从线粒体膜间隙扩散进入线粒体基质，然后再次电离释放质子 0.5 mol。

3.3 化学式

阿司匹林还有三种作用方式。一是使线粒体的氧化磷酸化解偶联。阿司匹林会携带质子从线粒体膜间隙扩散进入线粒体基质，然后再次电离释放质子 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 。



制取阿司匹林的反应通常归为酯化反应。水杨酸和乙酸酐（一种乙酸的衍生物）发生反应，水杨酸中的羟基替换为酯基，生成阿司匹林和副产物乙酸。通常用少量硫酸作催化剂（有时用磷酸）。

3.4 引用

3.4.1 索引

阿司匹林及其复方制剂都能有效治疗某几种头痛，但对另外几种则效果不明。因其他疾病或创伤导致的继发性头痛需要及时在医疗机构接受治疗。

3.4.2 脚注

阿司匹林及其复方制剂都能有效治疗某几种头痛，但对另外几种则效果不明¹。因其他疾病或创伤导致的继发性头痛需要及时在医疗机构接受治疗^{*}。

3.4.3 引用章节

阿司匹林及其复方制剂都能有效治疗某几种头痛，但对另外几种则效果不明第三章。因其他疾病或创伤导致的继发性头痛需要及时在医疗机构接受治疗小节 3.4.3。

3.4.4 参考文献

这是一个参考文献引用的范例^[1]。引用多个文献，将引用标号中的多个文献序号按升序排列，若其中有 2 个以上的连续序号，则改用范围序号，例如^[1-3]。

¹ 阿司匹林及其复方制剂都能有效治疗某几种头痛，但对另外几种则效果不明。因其他疾病或创伤导致的继发性头痛需要及时在医疗机构接受治疗。

^{*} 阿司匹林及其复方制剂都能有效治疗某几种头痛，但对另外几种则效果不明。因其他疾病或创伤导致的继发性头痛需要及时在医疗机构接受治疗。

附录 A 维基百科

A.1 阿司匹林

阿司匹林还有三种作用方式。一是使线粒体的氧化磷酸化解偶联。阿司匹林会携带质子从线粒体膜间隙扩散进入线粒体基质，然后再次电离释放质子。简而言之，阿司匹林作为缓冲剂运输质子，因此高剂量服用时会因电子传递链释放的热量而造成发热，这和低剂量服用的退烧作用相反。二是阿司匹林会促进一氧化氮自由基的生成。一氧化氮自由基本身在小鼠体内也有抗炎的作用，它能减少白细胞粘附，后者是免疫系统应对感染的重要一步。不过，没有足够证据表明阿司匹林能抗感染。第三，更新的研究表明水杨酸及其衍生物能通过 **NF- κ B** 调节细胞信号。**NF- κ B** 是一种转录因子复合体，在许多生物过程（包括发炎）中起重要作用。

阿司匹林在体内分解为水杨酸，而水杨酸本身则有抗炎、退烧、镇痛等作用。2012 年发现水杨酸还能激活 **AMP** 活化蛋白激酶，这是水杨酸和阿司匹林药效的一种可能的解释。阿司匹林分子中的乙酰基也并非没有作用。细胞蛋白的乙酰化是其转译后修饰中被广泛研究的现象。阿司匹林能使包括 **COX** 同工酶在内的几种蛋白质乙酰化。这些乙酰化反应可能可以阐释一些阿司匹林尚未得到解释的效应。

一般来说，成人用于治疗发烧或关节炎时每天服用四次，这和以前治疗风湿热时所用的剂量接近。有或怀疑有冠状动脉病史的人要预防心肌梗死（**MI**），每天低剂量服用一次即可。

参考文献

- [1] TVERSKY K A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.
- [2] SCAFF L A, HABERMAS J, BURGER T, et al. The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society[J]. American Political Science Review, 1989, 84(3): 967.
- [3] GRABE W, WARDHAUGH R. An introduction to sociolinguistics[J]. Language in Society, 2010, 36(2): 605-605.

图片索引

图 2.1 使用 subcaption 排版子图	5
--------------------------------	---

表格索引

表 2.1	使用 <code>tabularx</code> 创建内容过长表格 ·····	5
-------	---	---

代码索引

代码 3.1	python 程序练习题	7
--------	------------------------	---

索引

B

表格, [5](#)

C

插图, [5](#)

D

定理, [2](#), [7](#)

中文定理, [2](#)

English definition, [2](#)

G

公式, [4](#)

H

化学式, [7](#)

L

列表, [6](#)

常规列表, [6](#)

排序列表, [6](#)

主题列表, [6](#)

W

物理量, [7](#)

X

习题环境, [3](#)

Y

引用, [8](#)

参考文献, [8](#)

脚注, [8](#)

索引, [8](#)

Z

自定义盒子, [3](#)

摘要盒子, [2](#)